

甲型鏈球菌 感染。

病人須知

何謂甲型鏈球菌感染？

甲型鏈球菌 (GAS)

為可存在於鼻部、喉嚨或皮膚上的細菌（病菌），不會引發其它傷害或感染。有時，這些細菌可能進入身體中並不常發現它們的部位，如血液、肌肉或肺部。這會引發感染。

如何感染 GAS？

GAS

主要受感染者咳嗽、打噴嚏或與其接吻時，透過受感染者呼吸道（鼻部及喉嚨）的飛沫傳播。細菌亦可透過未清洗的雙手傳入傷口或開裂的皮膚。

如何得知感染了 GAS？

醫療護理人員（護士或醫生）將從受感染部位取樣，送至實驗室，透過試驗確定您是否有感染。您或會感到不適，出現高燒、喉嚨痛或腺體腫脹等症。

感染有多嚴重？

GAS

引發的感染介乎輕度至嚴重之間。大多數感染為輕度感染，如喉嚨痛或皮膚感染。

少數人或會變成較嚴重的感染，稱為侵入性甲型鏈球菌或 iGAS 感染。這種感染在細菌釋放蔓延至身體中其他部位（如血液、肌肉或肺部）的毒素時發生。所引發感染的程度有天壤之別，有時甚至需要醫療措施，如手術。

感染 GAS 後將如何治療？

大多數 GAS 感染者僅需 GP（家庭醫生）開出的抗生素（藥物），即可治愈。

如您已住院，則可能需留在單人房幾天，以防止感染傳播給其他人，服用抗生素直至治愈為止。

如您有呼吸道症，讓您的員工始終進行正確的潔手程序，穿戴手套、防護裙及口罩。

在探訪前後，員工會告訴您的親朋戚友，要用肥皂及水或酒精搓手液進行正確的潔手程序。

如您感染了 iGAS，所需的治療或包括其他醫療措施。員工始終會與您及您的家人討論這些措施。

如何才能阻止感染蔓延至朋友及家人？

大多數與 GAS 感染者接觸的人都不會感染。

請確保您用肥皂及水徹底洗淨雙手，尤其是在咳嗽、打噴嚏或接觸傷口或開裂的皮膚後。

如您的朋友或家人有以下任何跡象或症，他們應聯絡 GP（家庭醫生），並告知曾接觸 GAS 感染者。

- 喉嚨痛
- 發燒
- 肌肉疼痛
- 傷口周邊紅腫

如您感到擔憂，或不確定要對 **GAS** 感染採取何種措施，請與護士長、護士或負責照顧您的護理員交談。他們的詳細資料如下。

姓名：

部門：

電話號碼：

本單以多種語言、大字體及點字本（僅限英文）提供。如欲了解更多資料，請致電 0141 300 1100。

